

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO - PARANÁ

Concurso Público Municipal - Edital 02/2013 - DATA DA PROVA: 03/11/2013

PERÍODO DE PROVA: TARDE



FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina

CARGO: MÉDICO T6 I - PEDIATRA - PLANTONISTA

LEIA ESTAS INSTRUÇÕES:

- 1 Identifique-se na parte inferior desta capa;
- 2 Você dispõe de quatro horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta;
- 3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta;
- 4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas;
- 5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta;
- 6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal;
- 7 Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que acompanha a prova;
- 8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura;
- 9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta;
- 10 Este caderno de prova contém, 20 (vinte) questões de múltipla escolha (a,b,c,d,e);
- 11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta;
- 12 O candidato poderá levar consigo o Caderno de Prova se sair no transcorrer dos últimos 60 (sessenta) minutos de aplicação da prova;
- 13 Assine o Cartão Resposta no local indicado.

Identificação do candidato	
Nome (em letra de forma)	Nº da inscrição

Boa Prova!

01 - Sobre Hepatites Virais podemos afirmar, EXCETO:

- a) Para a hepatite C, o uso de certas medicações como o Interferon e a Ribavirina, em associação pode frear o processo de destruição do fígado. A cura depende do genótipo do vírus.
- b) Atualmente existem sete tipos de vírus conhecidos: A,B,C,D,E,F e G.
- c) Vários pacientes com hepatite aguda ou crônica podem ser assintomáticos. Os sintomas não são parâmetros para saber a evolução da doença.
- d) A hepatite crônica causa sempre menos danos ao fígado que a hepatite aguda.
- e) A transmissão do vírus da Hepatite B se faz por via parenteral, e, sobretudo, pela via sexual, sendo considerada uma doença sexualmente transmissível.

02 - Em qual das alternativas abaixo pode ser definido o diagnóstico de *Diabetes Mellitus*?

- a) Glicemia ao acaso = 210mg/dl em paciente assintomático.
- b) Glicemia de jejum = 120mg/dl.
- c) Glicemia de jejum = 90mg/dl.
- d) Glicemia duas horas após ingestão de 75g de dextrosol = 240mg/dl.
- e) Hemoglobina glicosilada = 8,0%.

03 - Das afirmações abaixo, assinale a incorreta:

- a) A pré clampsia leve é definida como hipertensão abaixo de 160/110mmHg, em pelo menos duas aferições, que acontecem após a 20ª semana de gestação em pacientes que nunca apresentaram manifestação hipertensiva.
- b) A síndrome HELLP é uma forma grave de pré-eclampsia caracterizada pelo aparecimento de hemólise, elevação das enzimas hepáticas e plaquetas em paciente cursando com hipertensão. As três alterações nem sempre aparecem simultaneamente, admitindo o conceito de HELLP parcial.
- c) A eclampsia caracteriza-se por crise convulsiva de características tonico-clônicas que podem aparecer em gestantes ou puérperas.
- d) A eclampsia é precedida pelo agravamento do quadro hipertensivo e por sintomas próprios da sua iminência ou sejam: cefaleia, diplopia, visão turva, escotomas, epigastralgia, dor em hipocôndrio direito.
- e) No quadro de superposição de pré-clampsia e hipertensão crônica em uma gestante, o diagnóstico é feito quando aparece proteinúria significativa em paciente hipertensa antes da gestação. Clinicamente, acontece um aumento agudo na pressão arterial, e a proteinúria serve como marcador desta associação.

04 - As manifestações da insuficiência respiratória aguda mais comuns são:

- a) Normopnéia, bradicardia e sonolência.
- b) Lábios rosados e avermelhados, bradicardia e confusão.
- c) Confusão, agitação, sonolência, dispnéia e taquicardia.
- d) Bradicardia, cianose e hipocapnia.
- e) Cianose, normopnéia e hipocapnia.

05 - Sobre as glomerulopatias, marque a alternativa errada:

- a) É importante diagnosticar a glomerulopatia e determinar o tipo de glomerulopatia, dentre os diversos existentes, para fazer o tratamento adequado.
- b) O exame de urina pode revelar a presença de hematúria e/ou proteinúria.
- c) Os pacientes com glomerulopatias podem ser assintomáticos ou apresentarem sintomas urinários (urina escura, diminuição do volume urinário) ou inchaço (de membros inferiores, face ou de todo o corpo).
- d) Quando se faz o diagnóstico de glomerulopatia, a função renal sempre estará deficiente.
- e) Se ela não é diagnosticada precocemente e/ou não é tratada adequadamente pode progredir para [insuficiência renal crônica terminal](#).

06 - São sintomas de anemia hemolítica, exceto:

- a) Dificuldades na concentração.
- b) Excesso de apetite.
- c) Falhas na memória.
- d) Palidez nas mucosas dos olhos e boca.
- e) Sensação de desmaio.

07 - Sobre hemorragia digestiva, marque a alternativa errada:

- a) Há casos em que o sangramento é ocasionado por doenças graves, como câncer.
- b) A hemorragia digestiva uma doença.
- c) O diagnóstico do sangramento é feito conforme o tipo da hemorragia (alta ou baixa), a partir de exames, como a endoscopia digestiva alta e a colonoscopia.
- d) O tratamento é prescrito conforme a causa do sangramento.
- e) Vômito com sangue vivo ou com aparência de borra de café, sangue escuro misturado nas fezes e sangue vivo revestindo ou misturado nas fezes são sinais de hemorragia digestiva alta.

08 - São causas de síndromes hemorrágicas na primeira metade da gestação, exceto:

- a) Abortamento.
- b) Descolamento corioamniótico.
- c) Rotura uterina.
- d) Gravidez ectópica.
- e) Neoplasia trofoblástica gestacional benigna.

09 - São causas frequentes da insuficiência hepática aguda, exceto:

- a) Consumo de drogas.
- b) Exposição à agentes químicos industriais.
- c) Hereditariedade.
- d) Medicamentos.
- e) Vírus.

10 - Sobre diarreias agudas, marque a alternativa errada:

- a) A maior parte das diarreias agudas tem resolução espontânea em poucos dias.
- b) A frequência, volume, aspecto e duração do episódio diarreico, junto ao exame clínico, permitem ao médico entender o tipo e a gravidade do quadro.
- c) Diarreias com perdas de grandes quantidades de líquido, em pessoas debilitadas por outras doenças, em idosos ou em crianças, podem evoluir para desidratação.
- d) A diarreia é observada como um aumento da consistência habitual das fezes que podem alcançar o estado mais sólido. O número de evacuações varia de um episódio isolado até mais de dez em 24 horas.
- e) O uso de diversos antibióticos pode levar à alteração da chamada "flora intestinal", a qual é um distúrbio ecológico que permite o desenvolvimento de alguns micróbios agressivos ao meio.

11 - São condições básicas para o êxito do tratamento de tuberculose, EXCETO:

- a) Acesso fácil do doente ao serviço de saúde.
- b) Existência de um Laboratório estadual responsável pela realização das baciloscopias, tanto para diagnóstico quanto para o acompanhamento.
- c) Garantia do fornecimento gratuito e ininterrupto da medicação específica.
- d) Orientação ao paciente.
- e) Unidade de saúde com profissionais treinados para fazer o diagnóstico e o acompanhamento do doente.

12 - São sintomas associados à insuficiência cardíaca congestiva, exceto:

- a) Dificuldade de respirar.
- b) Edema de membros superiores.
- c) Encurtamento da respiração ao repouso.
- d) Noctúria.
- e) Tosse crônica.

13 - Atenção especial deve ser dada para o tratamento supervisionado dos doentes pulmonares bacilíferos, (portadores de tuberculose) nas seguintes situações, EXCETO:

- a) Casos de retratamento após abandono.
- b) Diabéticos.
- c) Etilistas.
- d) Mendigos.
- e) Presidiários.

14 - O atendimento do doente politraumatizado deverá consistir em:

- a) Exame primário rápido.
- b) Exame secundário mais pormenorizado.
- c) O tratamento definitivo.
- d) Reanimação das funções vitais em deterioração.
- e) Todas as alternativas anteriores.

15 - São fatores que influenciam os níveis da pressão arterial, exceto:

- a) Consumo de bebidas alcoólicas.
- b) Estresse.
- c) Fumo.
- d) Níveis baixos de colesterol.
- e) Obesidade.

16 - As indicações absolutas para intubação endotraqueal frente a uma crise asmática são:

- a) Parada cardíaca.
- b) Parada respiratória.
- c) Significante alteração no estado mental.
- d) Pacientes que apresentam exaustão progressiva.
- e) Todas as alternativas anteriores.

17 - Sobre a síndrome nefrótica, marque a alternativa errada:

- a) As principais causas de síndrome nefrótica incluem todas as glomerulonefrites.
- b) O modo de início é abrupto.
- c) Ocorre nos pacientes que têm uma proteinúria (proteína na urina) maciça.
- d) Síndrome nefrótica não é uma doença, mas um conjunto de sinais e sintomas.
- e) Todos os tratamentos, quaisquer que sejam as causas, visam diminuir ou eliminar a perda anormal das proteínas urinárias.

18 - Sobre o hipotireoidismo, marque a alternativa errada:

- a) A causa mais comum de hipotireoidismo é quando a glândula da tireoide encontra-se exageradamente ativa, produzindo uma excessiva quantidade de hormônios, condição denominada também de bócio difuso tóxico ou Doença de Graves.
- b) O hipotireoidismo pode ser causado por uma série de motivos, embora o mais frequente seja uma variação autoimune, quando o próprio corpo começa a atacar a tireoide.
- c) O hipotireoidismo pode ser classificado como a baixa produção dos hormônios produzidos pela tireoide.
- d) O tratamento consiste na reposição hormonal, em geral, à base de levotiroxina (L-T4).
- e) Os sintomas podem ser resumidos em todos aqueles sinais de que o metabolismo está desacelerado, como menor número de batimentos cardíacos, intestino preso, menstruação irregular, diminuição da memória, cansaço excessivo e dores musculares.

19 - Algumas pessoas têm maior chance de serem vítimas de sepse. É população de risco de sepse: Marque a alternativa correta:

- a) Portadores de imunodeficiência por câncer, quimioterapia, uso de corticóide, doenças crônicas ou aids.
- b) Prematuros, crianças abaixo de 1 ano e idosos acima de 65 anos.
- c) Todas as alternativas acima.
- d) Usuários de álcool e drogas.
- e) Vítimas de traumatismos, queimaduras, acidentes automobilísticos e ferimentos à bala.

20 - A respeito das doenças infecciosas, marque a alternativa correta:

- a) A Esquistossomose é uma infecção que tem o *Schistosoma mansoni* como agente etiológico e tem os cães e gatos como principal reservatório.
- b) A Febre Tifóide tem como reservatório o macaco. O modo de transmissão se dá exclusivamente, por meio do contato sexual.
- c) A Hanseníase é doença aguda incurável, causada pelo bacilo de Hansen. Bacilo capaz de baixa infectividade e alta patogenicidade.
- d) A caxumba não é uma [doença](#) de transmissão respiratória, porém é altamente infecciosa.
- e) O vírus da Hepatite B é altamente infectante e facilmente transmitido pela via sexual. O período de incubação é em média 60 a 90 dias. A transmissibilidade acontece num período de 2 a 3 semanas, antes dos primeiros sintomas, mantendo-se durante a evolução da doença.

DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO.

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20